

レジメンcode:	C16-12
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	3wHER+カペシタビン
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
CAP	カペシタビン(セロータ)	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕～d15朝

[*]: 下表を参考

day1

1) 生食	50ml	1 本	
ルートを確保			
2) トラスツズマブ(ハーセプチン)	初回	8mg/kg	
	2回目以降	6mg/kg	
注射用水	100ml	1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本	21mg/mlの溶解液になる。
	主管①	点滴	30 分 (初回 90分)
3) 生食	50ml	1 本	
フラッシュ			

〈所要時間 約1時間〉

〈初回 約2時間〉

day1夕～15朝

カペシタビン(セロータ) [*] mg

1) 内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 36㎡未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36㎡～1. 66㎡未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66㎡～1. 96㎡未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96㎡以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】