

|           |         |
|-----------|---------|
| レジメンcode: | C16-30  |
| 適応がん種:    | 胃癌      |
| レジメン名:    | HER+SOX |
| 間隔:       | 3週間     |

|    |
|----|
| 備考 |
|----|

| 略名    | 抗がん剤(採用薬品名)         | 投与量     | 単位                | 投与法      | 投与日      |
|-------|---------------------|---------|-------------------|----------|----------|
| HER   | トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回) | 8       | mg/kg             | 点滴(90分)  |          |
|       | (2回目以降)             | 6       | mg/kg             | 点滴(30分)  | d1       |
| L-OHP | オキサリプラチン(エルプラット)    | 100[*1] | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(2時間)  | d1       |
| S-1   | エスワン                | [*2]    | mg                | 内服(朝夕食後) | d1夕~d15朝 |

[\*1]患者状態を考慮して、臨床試験の用量130mg/m<sup>2</sup>での投与可能。

[\*2]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

|                     |        |         |                   |                               |
|---------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 1) 生食               | 50ml   | 1 本     |                   |                               |
|                     |        |         |                   | ルート確保                         |
| 2) トラスツズマブ(ハーセプチン)  |        | 初回      | 8mg/kg            |                               |
|                     |        | 2回目以降   | 6mg/kg            |                               |
| 注射用水                | 100ml  | 1 本     |                   | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食                  | 100ml  | 1 本     |                   | 21mg/mlの溶解液になる。               |
|                     | 主管①    | 点滴      | 30 分              | (初回 90分)                      |
| 3) 生食               | 50ml   | 1 本     |                   |                               |
|                     | 主管②    | 点滴      | 15 分              |                               |
| 4) パロノセトロン          | 0.75mg | 1 V     |                   |                               |
| デキサート               | 6.6mg  | 1 V     |                   |                               |
| デキサート               | 3.3mg  | 1 A     |                   |                               |
| 生食                  | 50ml   | 1 本     |                   |                               |
|                     | 主管③    | 点滴      | 15分               |                               |
| 5) オキサリプラチン(エルプラット) |        | 100[*1] | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】                     |
| ブドウ糖液5%             | 500ml  | 1 袋     |                   |                               |
|                     | 主管④    | 点滴      | 2時間               |                               |
| 6) 生食               | 50ml   | 1 本     |                   |                               |
|                     |        |         |                   | フラッシュ                         |

<初回 約4時間30分>

<所要時間 約3時間30分>

day1夕~day15朝

|         |         |
|---------|---------|
| 1) エスワン | [*] mg  |
|         | 内服 朝夕食後 |

[\*]

| 体表面積                      | 投与量              |
|---------------------------|------------------|
| 1. 25m <sup>2</sup> 未満    | 40mg/回 【80mg/日】  |
| 1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満 | 50mg/回 【100mg/日】 |

1.5㎡以上

60mg/回 【120mg/日】