

レジメンcode:	C50-22
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	Eribulin療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	エリブリン	1.4	mg/m ²	点滴(全開)	d1、8

day1、8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) エリブリン		1.4 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	全開
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉

- * DLT: 好中球減少症および発熱性好中球減少症。減量を行う際、下記の用量を参考にすること。
- * QT間隔延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前は心電図検査及び電解質検査を行うこと。
- * 5%ブドウ糖希釈不可。生理食塩水を用いて希釈すること。0.01mg/ml未満の濃度に希釈しないこと。
- * 1バイアル(1mg/2ml)中に5%無水エタノールを0.1ml含有。

減量前の投与量 → 減量後の投与量
1.4mg/m ² → 1.1mg/m ²
1.1mg/m ² → 0.7mg/m ²
0.7mg/m ² → 投与中止を考慮