

レジメンcode:	C50-49
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	Sacituzumab Govitecan
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	トロデルビ	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、8

day1、8

- | | | |
|----------|-------|-------------|
| 1) カロナール | 500mg | 1 錠 |
| | 内服 | トロデルビ投与30分前 |

*infusion reactionを軽減させるため、トロデルビ投与30分前に上記の薬剤の内服を行なう事

day1、8【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|------------|--------|----------|-------------------------|
| 1) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| ガスター | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ポラミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 内服前投薬確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 15分 |
| 3) トロデルビ | | 10 mg/kg | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 250ml | 1 本 | 要遮光 |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 [*1]2回目以降は1時間まで短縮可能 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 30分 |

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約4時間30分〉

【文献】

海外第Ⅲ相試験【IMMU-132-05試験/ASCENT試験 N Engl J Med.2021 Apr 22;384(16) (PMID:33882206)】

【適応】

化学療法歴(タキサン系抗悪性腫瘍剤)のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

*調製後、輸液バッグを遮光すること

*希釈後、遮光下2～8℃で保存し24時間以内に使用すること。ただし、常温に戻した後、8時間以内に投与完了すること。

