

レジメンcode:	C85-07
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-ESHAP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
mPSL	ソル・メルコート	500	mg/body	点滴(30分)	d2～6
VP-16	エトポシド(ベプシド)	40	mg/m ²	点滴(2時間)	d2～5
CDDP	シスプラチン(ブリアプラチン)	25	mg/m ²	点滴(24時間)	d2～5
Ara-C	キロサイド[*2]	2000	mg/m ²	点滴(3時間)	d6

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
4) ヘパフラッシュ	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) 硫酸Mg補正液				1 A	
生食	500ml			1 袋	
	主管①	点滴	2時間		
2) 生食	500ml			1 袋	
	主管②	点滴	2時間		
3) グラニセトロン	3mg			1 A	
生食	50ml			1 本	
	▶側管①	点滴	15 分	主管②開始60分後から	
4) ソル・メルコート	500mg			1 V	
生食	100ml			1 本	
	▶側管②	点滴	30 分	側管①に続いて	
5) エトポシド(ベプシド)				40 mg/m ²	
生食	500ml			1 袋	
	主管③	点滴	2時間		
6) シスプラチン(フリプラチン)				25 mg/m ²	
生食	500ml			1 袋	
	主管④	点滴	24時間		
7) 生食	500ml			1 袋	
	▶側管③	点滴	2時間	主管④と同時に	
8) 生食	500ml			1 袋	
	▶側管④	点滴	2時間	側管③に続いて	

〈所要時間 ー 〉

次ページあり

day3～5

1) 硫酸Mg補正液			1 A	
生食	500ml		1 袋	
	▶側管①	点滴	2時間	
2) グラニセトロン	3mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	▶側管②	点滴	15 分	側管①に続いて
3) ソル・メルコート	500mg		1 V	
生食	100ml		1 本	
	▶側管③	点滴	30 分	側管②に続いて
4) エトポシド(ペプシド)			40 mg/m ²	
生食	500ml		1 袋	
	▶側管④	点滴	2時間	側管③に続いて
5) シスプラチン(フリプラチン)			25 mg/m ²	
生食	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて
6) 生食	500ml		1 袋	
	▶側管⑤	点滴	2時間	主管①と同時に
7) 生食	500ml		1 袋	
	▶側管⑥	点滴	2時間	側管⑤に続いて

〈所要時間 ー〉

次ページあり

[*2]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日6回

Ara-C終了3日目～9日目(7日間)

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日4回

day6

1) グラニセトロン

3mg 1 A

生食

50ml 1 本

主管① 点滴 15 分 前日の主管に続いて

2) ソル・メルコート

500mg 1 V

生食

100ml 1 本

主管② 点滴 30 分

3) キロサイド

2000 mg/m²

生食

500ml 総液量650ml以下になるように生食を調製

主管③ 点滴 3時間

4) 生食

500ml 1 袋

主管④ 点滴 2時間

〈所要時間 ー 〉