

レジメンcode:	C85-09
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-EPOCH
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*]	d1
VP-16	エトポシド(ペプシド)	50	mg/m ²	点滴(24時間)	d2~5
ADM	ドキシソビシン(アドリアシン)	10	mg/m ²	点滴(24時間)	d2~5
VCR	オンコビン	0.4	mg/m ²	点滴(24時間)	d2~5
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(30分)	d6
PSL	プレドニゾロン	60	mg/m ²	内服	d2~6

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*]
3) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
2) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m ²	
ドキソルビシン(アドリアシン)		10 mg/m ²	
オンコビン		0.4 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	24時間

〈所要時間 ー 〉

day3～5

1) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m ²	
ドキソルビシン(アドリアシン)		10 mg/m ²	
オンコビン		0.4 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて
2) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分

〈所要時間 ー 〉

day6

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分 前日の主管に続いて
2) エンドキサン		750 mg/m ²	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30分
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉

day2～6

1) プレドニゾロン		60 mg/m ²	
	内服	朝・昼食後	