

レジメンcode:	C85-17
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	Bendamustine-R
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	ベンダムスチン(トリアキシン)	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1、2
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*1]	d1

day1

1) カロナール	200mg	2錠
ベポタスチンOD	10mg	1錠
	内服	リツキシマブ投与30分前

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	3.3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1本
	主管①	点滴 15分 内服前投薬、心電図確認
2) ベンダムスチン(トリアキシン)		90 mg/m <sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1袋
	主管②	点滴 1時間 調製後、6時間以内に投与を終了すること
3) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m <sup>2</sup>
生食	500ml	生食で10倍に希釈
	主管③	点滴 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
4) 生食	50ml	1本
		フラッシュ
5) 生食		10 ml
		ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

次ページあり

day2【ケモセーフ使用】

---

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15分
2) ペンダムスチン(トリアキシン)		90 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	1時間 調製後、6時間以内に投与を終了すること
3) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	
			〈所要時間 約2時間〉